

ROMÂNIA
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Strada Latină nr. 8, sector 2 București
Tel.: 021.316.94.08; fax: 021.316.88.61

Președinte CNPP

O R D I N nr. 1137
din 23.10.2017

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, domnul Robert Iulian STĂNESCU, numit în baza Deciziei nr.214/01.03.2017, a Primului - ministru al Guvernului României;

Având în vedere:

Dispozițiile art.44 din Legea nr.346/2002, republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale;

Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice;

Hotărârea nr. 1.229 din 13 octombrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacității de muncă

Dispozițiile art.68 din Ordinul nr.450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

Referatul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă înaintat prin adresa nr. RS3477/04.10.2017;

În temeiul prevederilor art.9 din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.118/2012, cu modificările ulterioare, președintele Casei Naționale de Pensii Publice emite următorul:

O R D I N


Art.1 - Se aprobă „Criteriile medicale pentru evaluarea incapacității adaptative pentru asigurații care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale care solicită compensații pentru atingerea integrității, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale”, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art.2 - Criteriile prevăzute la art. 1 se aplică de către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și compartimentele de expertiză medicală, din cadrul caselor teritoriale de pensii.

Art.3 - Direcția Resurse Umane din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, casele teritoriale de pensii și Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în conformitate cu prevederile Regulamentului intern și a Regulamentului de organizare și funcționare.

**PREȘEDINTE
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE**

Robert - Iulian STĂNESCU



**CRITERII MEDICALE PENTRU EVALUAREA INCAPACITĂȚII
ADAPTATIVE PENTRU ASIGURAȚII CARE AU SUFERIT ACCIDENTE DE
MUNCĂ SAU BOLI PROFESIONALE CARE SOLICITĂ COMPENSAȚII
PENTRU ATINGEREA INTEGRITĂȚII CONFORM LEGII 346/2002**

**GRILĂ PRIVIND ACORDAREA COMPENSAȚIILOR PENTRU ATINGEREA
INTEGRITĂȚII**

conform Anexei nr. 14 din Ordinul 450/825 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.	Procentul incapacității adaptative	Numărul de salarii medii brute acordate
1	Între 20% și 25% inclusiv	2
2	Între 25% și 30% inclusiv	4
3	Între 30% și 35% inclusiv	6
4	Între 35% și 40% inclusiv	8
5	Între 40% și 45% inclusiv	10
6	Între 45% și 50% exclusiv	12

CRITERII BOLI PROFESIONALE

1.NEOPLAZII - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

Boala neoplazică fără reacții adverse ale tratamentului, fără determinări secundare, fără recidive	între 40% și 45% inclusiv
--	---------------------------

2. ALTE BOLI ȘI MODIFICĂRI HEMATOLOGICE NONMALIGNNE - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

Anemii ușoare	15%
Agranulocitoza	între 45% - 50% exclusiv
Methemoglobinemie	între 45% - 50% exclusiv

3. AFECȚIUNI PSIHICE ȘI COMPORTAMENTALE - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

Sindromul posttraumatic	
GAFS	IA
100 - 81	15%
80 - 61	între 25% și 30% inclusiv

4. BOLI NEUROLOGICE - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

		IA
Parkinson secundar		între 45% și 50% exclusiv
Mononeuropatia membrelor superioare - formele clinice cu simptomatologie senzitivă		unilateral - între 20% și 25% inclusiv bilateral -- între 25% și 30% inclusiv
Sindromul de compresie a nervului sciatic - formele clinice cu simptomatologie senzitivă		unilateral - între 20% și 25% inclusiv bilateral -- între 25% și 30% inclusiv
Neuropatia - formele clinice cu simptomatologie senzitivă		unilateral - între 20% și 25% inclusiv bilateral -- între 25% și 30% inclusiv
Mielita - formele cu recuperare medie		între 40% și 45% inclusiv
Nevrita trigeminală		între 25% și 30% inclusiv
Encefalopatia toxică		între 45% și 50% exclusiv
Paralizii	Paralizia nervului femurocutanat	15%
	Paralizia parțială de plex brahial tip superior (Duchenn Erb) și tip mijlociu (Remack)	între 45% și 50% exclusiv

5. BOLI ALE ANALIZATORULUI VIZUAL - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

AV și CV, după care se stabilește deficiența funcțională, se referă la ochiul cel mai bun și cu corecția utilă cea mai bună.

		IA
Conjunctivite		5%
Nistagmus		5%
Astenopie acomodativă		5%
Cheratite	AV = 1 – 2/3	10%
	AV = 1/2 -1/3	între 20% și 25% inclusiv
Cataracte	Fără scaderea AV	5%
	AV = 1/2 – 1/3	10%

Nevrită optică, ambliopie, uveită	AV = 2/3 – 1/3	10%
Diplopie		între 20% și 25% inclusiv
Endoftalmie, formă ușoară	AV = 2/3 – 1/3	10%

6. BOLI ALE ANALIZATORULUI AUDITIV - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

dB	Pierdere auditivă	IA
0 - 25	Fără pierdere auditivă	5%
26 - 35	Pierdere auditivă ușoară	10%
36 - 70	Pierdere auditivă medie	între 20% - 25% inclusiv
71 - 80	Pierdere auditivă accentuată	între 25% - 30% inclusiv
> 81	Pierdere auditivă gravă	între 35% - 40% inclusiv

7. BOLI ALE APARATULUI CARDIOVASCULAR - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

SINDROM RAYNAUD	
Formă ușoară	10%
Formă moderată	între 20% și 25% inclusiv
Formă severă	între 35% și 40% inclusiv

TOMBOFLEBITA MEMBRELOR SUPERIOARE	
Unilaterală	între 35% și 40% inclusiv
Bilaterală	între 40% și 45% inclusiv

TROMBOFLEBITA PROFUNDĂ A MEMBRELOR INFERIOARE	
Unilateral	între 35% și 40% inclusiv
Bilateral	între 40% și 45% inclusiv

8. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

RINITE	
Leziuni unilaterale, forma intermitentă a rinitei alergice, fără tulburări ventilatorii nazale, sau tulburări ventilatorii nazale unilaterale	5%
Leziuni bilaterale, forma persistentă ușoară a rinitei alergice, tulburări ventilatorii nazale bilaterale	10%

ULCER NAZAL ȘI/SAU PERFORAȚIA SEPTULUI NAZAL	
După tratament chirurgical, fără prezența tulburărilor respiratorii	5%
După tratament chirurgical, cu prezența tulburărilor respiratorii	10%

LARINGITA, NODULII CORZILOR VOCALE (“NODULII CÂNTĂREȚILOR”)	
Comunicare audibilă, total comprehensibilă în mediu zgomotos și la telefon	10%
Comunicare greu audibilă, parțial comprehensibilă în mediu zgomotos și la telefon	20 – 25%%

AFECTIUNI PULMONARE și de CĂI RESPIRATORII INFERIOARE	
Fără deficiență respiratorie (VEMS > 80% din prezis)	10%
Disfuncție ventilatorie (de tip obstructiv, restrictiv sau mixt) ușoară (VEMS < 80% până la 65% din prezis)	între 20% și 25% inclusiv
Disfuncție ventilatorie (de tip obstructiv, restrictiv sau mixt) moderată (VEMS < 65% până la 60% din prezis)	între 30% și 35% inclusiv

9. BOLILE FICATULUI - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

Hepatite toxice Hepatite infecțioase	între 40% și 45% inclusiv
---	---------------------------

10. BOLI ALE PIELII ȘI ALE ȚESUTULUI SUBCUTANAT - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

Dermatita alergică de contact	între 20% și 25% inclusiv
Dermatita ortoergică de contact	între 20% și 25% inclusiv
Dermatita de contact mixtă (alergică și iritativă)	între 20% și 25% inclusiv
Urticarie	între 20% și 25% inclusiv
Angioedem (edem Quincke), șoc anafilactic	între 40% și 45% inclusiv
Radiodermita	între 45% și 50% exclusiv
Acneea profesională	între 20% și 25% inclusiv
Porfirie cutanată tardivă (tarda)	între 20% și 25% inclusiv

11. BOLI ALE SISTEMULUI MUSCULO-SCHELETAL ȘI ALE ȚESUTULUI CONJUNCTIV

- vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

BURSITE, EPICONDILITE, SINOVITE, TENDINITE, TENOSINOVITE, LEZIUNI DE MENISC	IA = 15%
--	----------

PERIARTITE	IA
a. Periartrita scapulohumerală	
Sindromul de „acroșare” unilateral, determinat de o suferință a tendonului supraspinosului	15%
Tendinita degenerativă („sindromul supraspinosului”) unilaterală	15%
Tendinita calcificată și bursita unilaterală	15%
Capsulita retractilă (denumită și umăr blocat unilateral)	între 40% și 45% inclusiv
b. Periartrita coxofemurală	
Sindromul tensorului „fascia lata” (șoldul „în resort”)	15%
Bursita adductorilor	între 20 și 25% inclusiv
Bursita ileopectineală și tendinita psoasului iliac	între 20 și 25% inclusiv
Bursita trohanteriană	între 20 și 25% inclusiv
Periartrita coxofemurală subacută și cronică	între 30 și 35% inclusiv

DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE (scolioză, cifoscolioză cu grad de curbură < 60°)	
fără disfuncție ventilatorie	15%
cu disfuncție ventilatorie ușoară	între 20% și 25% inclusiv

ARTROZELE SECUNDARE ALE MÂINILOR	
Artroze interfalangiene distale secundare unilaterale cu limitări minime a mobilității și ușoare deformări ale falangelor distale	5%
Artroze interfalangiene distale secundare bilaterale cu limitări minime a mobilității și ușoare deformări ale falangelor distale	unilateral - 5% bilateral - 10%
Artroze interfalangiene proximale secundare unilaterale cu ușoară limitare a mobilității, cu deformări minime ale articulațiilor	10%
Artroze interfalangiene proximale secundare bilaterale cu redoare interfalangiană și dezaxări (după fracturi de falange sau leziuni ligamentare)	15%
Artroză secundară a policelui unilateral (artroză trapezometacarpiană) cu dureri și limitarea mobilității policelui	între 30% și 35% inclusiv
Artroză secundară a policelui bilateral (artroză trapezometacarpiană) cu dureri și limitarea mobilității policelui	între 35% și 40% inclusiv

ARTROZELE PICIORULUI SECUNDARE unor traumatisme sau presiuni prelungite asupra articulațiilor	
Artroza secundară metatarsofalangiană a degetului mare unilateral sau bilateral, tip hallux valgus uni sau bilateral, cu deformări în ax și acuze de tip mecanic în zona antero-internă a piciorului	unilateral - 5% bilateral - 10%
Artroza secundară tarsometatarsiană unilateral sau bilateral, asociat cu picior plat sau picior scobit, cu dureri la mers și ortostatism prelungit	unilateral - 10% bilateral - 15%
Artroza secundară metatarsofalangiană a degetului mare în faza de hallux rigidus, cu sinovită secundară și bursită unilaterală sau bilaterală	unilateral - între 20% și 25% inclusiv bilateral între 25% și 30% inclusiv
Artroza secundară metatarsofalangiană a degetului II (osteonecroză capitometatarsiene) unilaterală sau bilaterală, cu dureri la dorsoflexia piciorului la mers	unilateral - între 30% și 35% inclusiv bilateral - între 35% și 40% inclusiv

GONARTROZA SECUNDARĂ	
Artroză incipientă femuro-patelară secundară unilaterală sau bilaterală	unilateral - 5% bilateral - 10%
Gonartroză secundară unilaterală (de tipul artrozei femuro-patelară și femuro-tibială incipientă), fără limitarea mobilității	unilateral - între 20% și 25% inclusiv bilateral - între 25% și 30% inclusiv
Gonartroză secundară de tipul artrozei femuro-tibiale incipiente unilaterale însoțite de laxitate genunchi unilateral (leziuni ale ligamentelor colaterale, instabilitate laterală mică)	între 45% și 50% exclusiv

COXARTROZA SECUNDARĂ	
Coxartroză secundară polară superioară și inferioară unilaterală	5%
Coxartroză secundară polară superioară și inferioară bilaterală	10%
Coxartroză secundară unilaterală cu coxa profunda de grad 1	între 20% și 25% inclusiv
Coxartroză secundară unilaterală cu coxa profunda de grad 2	între 25% și 30% inclusiv
Coxartroză secundară unilaterală cu coxa profunda de grad 3, protruzie acetabulară bilaterală	între 40% și 45% inclusiv

FRACTURI OSOASE	
Fracturi consolidate, fără sechele	10%
Fracturi consolidate cu redoare articulară usoară/medie	15%
Fracturi consolidate cu redoare strânsă, anchiloze	Vezi redori strânse/ anchiloze AM

SPONDILOZE	
Spondiloză cervicală cu dureri cervicale exacerbate de oboseală fizică și intelectuală	10%
Spondiloză cervicală cu torticolis cronic, redoare a coloanei vertebrale cervicale cu înclinarea laterală a capului dureroasă și blocarea mișcărilor de rotație	între 20% și 25% inclusiv
Spondiloză dorsală secundară cu dorsalgie cronică, cu/fără tulburări de statică vertebrală	10%
Spondiloză lombară secundară cu lombalgie cronică	10%

DISCOPATII, INCLUSIV HERNIA DE DISC	
Discopatia vertebrală faza I	15%
Discopatia vertebrală faza II	15%
Discopatia vertebrală faza III/stadiul 1	între 20% și 25% inclusiv
Hernia de disc operată, fara sechele neurologice	între 20% și 25% inclusiv

12. BOLI ALE APARATULUI EXCRETOR vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

Nefropatia toxică	între 40% și 45% inclusiv
Nefropatia infecțioasă	

13. BOLI PROFESIONALE CAUZATE DE EXPUNEREA LA AGENȚI FIZICI NECLASIFICAȚI ANTERIOR - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

14. BOLI INFECȚIOASE ȘI PARAZITARE - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

15. INTOXICAȚII CRONICE PROFESIONALE ȘI CONSECINȚELE LOR - vezi Anexa nr. 14 din HG 955/2010

- Vor fi încadrați în funcție de organul (organele) țintă afectate – conform criteriilor de la capitolele respective.
- Incapacitatea adaptativă se apreciază după încheierea tratamentului specific și a perioadei de recuperare prevăzută de lege.
- Evaluarea funcțională se face, în funcție de localizare, conform criteriilor și grilelor de la capitolele respective.

CRITERII ACCIDENTE DE MUNCĂ

I. SECHELE MUSCULO-SCHELETALE

A. Sechele posttraumatice la nivelul membrelor (redori, anchiloze, pseudartroze, amputații)

SECHELE POSTTRAUMATICE LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE	
REDORI STRÂNSE / ANCHILOZE	IA
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiană o articulație distală unilateral	5%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiană o articulație distală bilateral	10%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiene două sau mai multe articulații distale unilateral	5%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiene două sau mai multe articulații distale bilateral	10%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiană o articulație proximală unilateral	5%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiană o articulație proximală bilateral	10%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiene două sau mai multe articulații proximale unilateral	5%
Redoare strânsă / anchiloză interfalangiene două sau mai multe articulații proximale bilateral	10%
Redoare strânsă / anchiloză police (articulație trapezometacarpiană) unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Redoare strânsă / anchiloză police (articulație trapezometacarpiană) bilateral	între 30% și 35% inclusiv
Redoare strânsă / anchiloză pumn (articulație radiocarpiană) unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Redoare strânsă / anchiloză pumn (articulație radiocarpiană) bilateral	între 30% și 35% inclusiv
Redoare strânsă / anchiloză cot unilateral	între 35% și 40% inclusiv
Redoare strânsă / anchiloză scapulo-humerală unilateral	între 40% și 45% inclusiv

SECHELE POSTTRAUMATICE LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE	
PSEUDARTROZE	IA
Oase antebrăţ unilateral	între 30% şi 35% inclusiv
Oase antebrăţ bilateral	între 35% şi 40% inclusiv
Humerus unilateral	între 40% şi 45% inclusiv
Humerus bilateral	între 45% şi 50% exclusiv

SECHELE POSTTRAUMATICE LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE	
AMPUTAȚII	IA
Lipsa prin amputație a ultimelor falange de la toate degetele unilateral	între 20% şi 25% inclusiv
Lipsa prin amputație a ultimelor falange de la toate degetele bilateral	între 40% şi 45% inclusiv
Lipsa prin amputație a 1-3 degete (în afara policelui) unilateral	între 25% şi 30% inclusiv
Lipsa prin amputație a 1-3 degete (în afara policelui) bilateral	între 30% şi 35% inclusiv
Lipsa prin amputație a 4 degete (în afara policelui) unilateral	între 40% şi 45% inclusiv
Lipsa prin amputație a policelui unilateral	între 30% şi 35% inclusiv

SECHELE POSTTRAUMATICE LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE	
REDORI STRÂNSE / ANCHILOZE	IA
Redoare strânsă / anchiloză gleznă unilateral	între 30% şi 35% inclusiv

SECHELE POSTTRAUMATICE LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE	
PSEUDARTROZE	IA
Oase degetele piciorului unilateral	între 20% şi 25% inclusiv
Oase degetele piciorului bilateral	între 25% şi 30% inclusiv

SECHELE POSTTRAUMATICE LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE	
AMPUTAȚII	IA
Lipsa prin amputație parțială sau totală a degetelor unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Lipsa prin amputație parțială sau totală a degetelor bilateral	între 25% și 30% inclusiv
Lipsa prin amputație tarso-metatarsiană unilateral	între 35% și 40% inclusiv
Lipsa prin amputație intratarsiană unilateral	între 40% și 45% inclusiv

B. Sechele posttraumatice la nivelul coloanei vertebrale lombare și oaselor cutiei toracice

		IA
Sindrom algic posttraumatic		10%
Tasări vertebrale fără răsunset radicular sau medular		între 30% și 35% inclusiv
Fracturi vertebrale fără răsunset radicular sau medular		între 35% și 40% inclusiv
Anchiloza unui segment de coloană (osteosinteză posttraumatică)		între 40% și 45% inclusiv
Scolioză, cifoscolioză cu grad de curbură $< 60^0$	fără disfuncție ventilatorie	15%
	cu disfuncție ventilatorie ușoară	între 40% și 45% inclusiv

C. Sechele posttraumatice la nivelul oaselor cutiei craniene

		IA
Lipsa posttraumatică a unei porțiuni de cutie craniană	Diametrul < 3 cm	între 20% și 25% inclusiv
	Diametrul > 3 cm	între 25% și 30% inclusiv

II. SECHELE NEUROLOGICE

TRAUMATISME CRANIOCEREBRALE	IA
TCC minore (cefalee, lipotimie, greață, ± greață, ±dificultăți de concentrare, ușoară încheșurare a privirii, ± amnezie pentru o scurtă perioadă de timp în jurul impactului	între 25% și 30% inclusiv

AFECTAREA NERVILOR CRANIENI		
Perechea I (nerv olfactiv)		15%
Perechea II (nervul optic)	AV = 1- 2/3, CV normal	15%
	AV = 1/2 - 1/3, CV normal	între 40% și 45% inclusiv
Perechea III (oculomotor comun)	unilaterală parțială cu ptoză palpebrală parțială	între 20% și 25% inclusiv
	unilaterală cu ptoză palpebrală și strabism	între 25% și 30% inclusiv
Perechea V (trigemen)		între 25% și 30% inclusiv
Perechea VI (oculomotor extern)	unilaterală	15%
	bilaterală	între 20% și 25% inclusiv
Perechea VII (facial)	unilaterală	între 25% și 30% inclusiv

AFECTAREA NERVILOR PERIFERICI	
Leziunea de nerv radial doar cu tulburări de sensibilitate unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Leziunea de nerv radial doar cu tulburări de sensibilitate bilateral	între 25% și 30% inclusiv
Leziunea de nerv cubital doar cu tulburări de sensibilitate unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Leziunea de nerv cubital doar cu tulburări de sensibilitate bilateral	între 25% și 30% inclusiv
Leziunea de nerv femurocutanat doar cu tulburări de sensibilitate unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Leziunea de nerv femurocutanat doar cu tulburări de sensibilitate bilateral	între 25% și 30% inclusiv

Leziunea de nerv sciatic doar cu tulburări de sensibilitate unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Leziunea de nerv sciatic doar cu tulburări de sensibilitate bilateral	între 25% și 30% inclusiv

III. SECHELE PSIHICE POSTRUMATICE

GAFS	IA
100 - 81	15%
80 - 61	între 25% și 30% inclusiv

IV. SECHELE VIZUALE POSTTRAUMATICE

AV și CV, după care se stabilește deficiența funcțională, se referă la ochiul cel mai bun și cu corecția utilă cea mai bună.

	AV	CV	IA
Traumatismul ocular (contuzia)	1 – 2/3	Normal	15%
	1/2-1/3	Normal	între 40% și 45% inclusiv
Monoculus (un singur ochi funcțional, un ochi enucleat)	1 f.c.	normal	între 45% și 50% exclusiv

V. SECHELE AUDITIVE POSTTRAUMATICE

dB	Pierdere auditivă	IA
0 - 25	Fără pierdere auditivă	5%
26 - 35	Pierdere auditivă ușoară	10%
36 - 70	Pierdere auditivă medie	între 20% - 25% inclusiv
71 - 80	Pierdere auditivă accentuată	între 25% - 30% inclusiv
> 81	Pierdere auditivă gravă	între 35% - 40% inclusiv

VI. SECHELE POSTTRAUMATICE ALE ORGANELOR INTERNE

	IA
Rezecție gastrică posttraumatică, fără deficit ponderal sau cu deficit ponderal ușor, ± anemie formă ușoară	între 40% și 45% inclusiv

Rezecții intestinale posttraumatice, fără sindrom de intestin scurt, fără deficit ponderal sau cu deficit ponderal ușor, ± anemie formă ușoară	între 40% și 45% inclusiv
Rezecții posttraumatice de pancreas, fără semne de insuficiență pancreatică	între 35% și 40% inclusiv
Ruptură de vase hepatice sau segmentectomii posttraumatice ale ficatului, fără afectarea funcției hepatice	între 35% și 40% inclusiv
Splenectomie posttraumatică de necesitate	între 35% și 40% inclusiv
Rinichi unic chirurgical posttraumatic, cu funcție normală și patologie absentă a rinichiului restant	între 40% și 45% inclusiv
Rezecția posttraumatică parțială totală a unui plămân, cu funcție ventilatorie păstrată sau cu disfuncție ventilatorie ușoară	între 40% și 45% inclusiv

VII. SECHELE POSTCOMBUSTIONALE

SECHELE POSTCOMBUSTIONALE LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE	
	IA
Cicatrici deformante ale membrului superior, fără/redoare ușoară de articulații interfalangiene, pumn, cot, umăr	unilateral - între 25% și 30% inclusiv bilateral - între 30% și 35% inclusiv
Cicatrici deformante ale membrului superior, cu redoare strânsă articulații interfalangiene unilateral/bilateral, pumn unilateral/bilateral	unilateral - între 35% - 40% inclusiv bilateral între 40% și 45% inclusiv
Cicatrici deformante ale membrului superior, cu redoare strânsă articulații cot unilateral, umăr unilateral	între 40% și 45% inclusiv
Lipsa prin amputație a ultimelor falange de la toate degetele unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Lipsa prin amputație a ultimelor falange de la toate degetele bilateral	între 40% și 45% inclusiv
Lipsa prin amputație a 1-3 degete (în afara policelui) unilateral	între 25% și 30% inclusiv
Lipsa prin amputație a 1-3 degete (în afara policelui) bilateral	între 30% și 35% inclusiv
Lipsa prin amputație a 4 degete (în afara policelui) unilateral	între 40% și 45% inclusiv
Lipsa prin amputație a policelui unilateral	între 30% și 35% inclusiv

SECHELE POSTCOMBUSTIONALE LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE	
	IA
Cicatrici deformante ale membrului inferior, fără/redoare ușoară de articulații interfalangiene, gleznă, genunchi	unilateral - între 30% și 35% inclusiv bilateral - între 35% și 40%

	inclusiv
Cicatrici deformante ale membrelor inferioare, cu redoare strânsă/anchiloză de gleznă unilateral	între 40% și 45% inclusiv
Lipsa prin amputație parțială sau totală a degetelor unilateral	între 20% și 25% inclusiv
Lipsa prin amputație parțială sau totală a degetelor bilateral	între 25% și 30% inclusiv
Lipsa prin amputație tarso-metatarsiană unilateral	între 35% și 40% inclusiv
Lipsa prin amputație intratarsiană unilateral	între 40% și 45% inclusiv

SECHELE POSTCOMBUSTIONALE LA NIVELUL EXTREMITĂȚII CEFALICE, TORACELUI ȘI ABDOMELULUI

	IA
Cicatrici ale extremităților cefalice și/sau ale toracelui și/abdomenului, fără afectare funcțională (respiratorie, fonatorie, masticatorie)	între 40% și 45% inclusiv
Cicatrici localizate la nivelul feței, dacă suprafața acestora nu depășește 50% din suprafața feței, asociate sau nu cu cicatrici localizate la nivelul scalpului, cu alopecie care nu depășește 50% din suprafața scalpului	între 45% și 50% exclusiv
Cicatrici postcombustionale la nivelul pleoapelor, fără răsunet asupra funcționalității oculare	între 35% și 40% inclusiv

VIII. INTOXICAȚIILE CRONICE PROFESIONALE ȘI CONSECINȚELE LOR

- Incapacitatea adaptativă se apreciază după încheierea tratamentului specific și a perioadei de recuperare prevăzută de lege.
- Evaluarea funcțională se face în funcție de organul (organele) țintă afectate, conform criteriilor și grilelor de la capitolele respective.

TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE
Conform Anexei nr. 14 din HG 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006

1. Neoplazii

Boala	Noxa profesională
Neoplasm hepatic și al ductelor biliare intrahepatice	Arsen și compuși
	Clorură de vinil monomer
	Virusuri hepatitice B și C
Neoplasm al cavității (foselor) nazale și/sau al sinusurilor	Crom hexavalent și compuși
	Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului concentrat
	Formaldehidă
	Nichel și compuși
	Pulberi de lemn
Neoplasm nazofaringian	Formaldehidă
Neoplasm laringian	Azbest
Neoplasm bronhopulmonar	Arsen și compuși
	Azbest
	Beriliu
	Bisclormetileter și derivați
	Cadmium și compuși
	Carbura de tungsten
	Clormetil-metileter
	Clorura de vinil
	Cobalt
	Crom hexavalent și compuși
	Dioxid de siliciu liber cristalin
	Formaldehidă
	Gaze muștar
	Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum și altele)
	Nichel și compuși
	Oxizi de fier
	Radiații ionizante
	Radon și produși de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)
	Talc cu conținut de azbest
	Uleiuri minerale
Neoplasm osos și al cartilajului articular al membrelor și cu alte localizări	Radiații ionizante
Neoplasme ale pielii: - epiteliom spinocelular - epiteliom bazocelular - melanom malign - boala Bowen (carcinom in situ)	Arsen și compuși
	Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru de fum, produși de gazeificare a carbunelui, smoală, produse petroliere, uleiuri minerale și altele)
	Radiații ionizante
	Uleiuri minerale
Mezoteliom pleural	Azbest

Mezoteliom peritoneal	
Neoplasm al vezicii și al căilor urinare	Amino - și nitroderivați aromatici
	Arsen și compuși
	Auramină
	Benzen
	Benzidina și derivați
	Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum și altele)
	2-Naftilamină
Neoplasm al tractului digestiv	Uleiuri minerale
	Gaze muștar
	Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum și altele)
Glioblastom	Uleiuri minerale
	Derivați de nitrozuree și nitrozoguanidine
Neoplasm mamar	Hormoni sexuali (dietilstilbestrol și altele)
Neoplasm al tractului genital feminin	
Neoplasm al tractului genital masculin	Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de fum și altele)
Leucemii	Benzen și derivați
	Etilen-oxid (oxid de etilenă)
	Formaldehidă
	Radiații ionizante
Limfom non-Hodgkinian	Formaldehidă
Alte afecțiuni maligne cauzate de expunerea profesională obiectivată și evaluată la unul sau mai mulți agenți din lista IARC	Agenți cancerigeni cerți din lista IARC

2. Alte boli și modificări hematologice nonmaligne

Boala profesională	Noxa profesională
Anemie	Ankylostoma duodenale
	Arsen și compuși
	Benzen
	Brucella
	Butil de staniu
	Cimen (paracimol)
	Compuși organofosforici și organoclorurați
	Crezoli
	Fosfor și compuși
	Hidrocarburi alifactice halogenate (clorura de metil = monoclorometan, hexaclorociclohexan = Lindan, tricloretilena etc.)
	Hidrogen arseniat (arșina)
	Medicamente
	Mesitilen
	Metilcelosolv
	Monoxid de carbon
	Naftalină
	Nitro-, cloro- și cloronitroderivați aromatici (monoclorbenzen,

	o-diclorbenzen, DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol etc.)
	p-Butilbenzen
	Pirocatechină
	Pirogalol
	Plumb
	Radiații ionizante
	Silicat de etil
	Trimetilbenzen (pseudocumen) și alte hidrocarburi aromatice și altele
Agranulocitoză	Benzen
	Radiații ionizante
	Trinitrotoluen
	și altele
Methemoglobinemie	Amino - și nitroderivați
	Hidrogen arseniat
	Oxizi de azot
	Pirocatechină
	Pirogalol
	Rezorcină
	și altele

3. Afecțiuni psihice și comportamentale

Boala profesională	Noxa profesională
Sindrom posttraumatic	Traumatisme craniene prin accident de muncă

4. Boli neurologice

Boala profesională	Noxa profesională
Parkinson secundar	Mangan (dioxid de mangan)
	Mercur și compuși
	Monoxid de carbon
	Sulfura de carbon
Afecțiuni extrapiramidale și tulburări de motilitate: - ataxie/tremor intențional și altele	Acrilamida
	Furfural
	N-Hexan
	Hidrocarburi alifactice halogenate
	Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
	Mangan
	Mercur și compuși
	Toluen
	și altele
Mononeuropatia membrelor superioare: - sindrom de tunel carpian - sindromul de tunel cubital Guyon - sindromul epitrohleo-olecranian - sindromul de tunel radial - alte mononeuropatii ale membrelor superioare	Mișcări repetitive. Vibrații. Poziții extreme ale articulațiilor (în special asocierea acestor factori de risc)
Sindrom de compresie a nervului sciatic	Poziții vicioase

Neuropatie	Acrilamida
	Arsen și compuși
	Borrelia (maladia Lyme)
	Brucella (bruceloza cronică)
	Compuși organofosforici
	Dimetil aminopropionitril
	Etilen-oxid (oxid de etilenă)
	Hidrocarburi alifatice halogenate
	Hidrocarburi alifatice (N-hexan, ciclohexan și altele)
	Hidrocarburi aromatice
	Mercur
	Metil-N-butyl-cetona
	Plumb
	Sulfură de carbon
	Taliu
	Virusul hepatitic C
	Virusul varicelo-zosterian
	Vibrații
	și altele
Mielita	Borrelia (maladia Lyme)
	Bromura de metil (monobrommetan)
	Brucella (bruceloza cronică)
	și altele
Nevrita trigeminală	Hidrocarburi alifatice halogenate
	Nitro - și aminoderivați aromatici
	și altele
Encefalopatia toxică	Acetonitril
	Alcooli
	Aldehyde
	Amine aromatice și derivați
	Arsen și compuși
	Cetone
	Decaboran
	Dimetilformamida
	Dimetilsulfoxid (DMSO)
	Esteri
	Eteri
	Glicoli
	Hidrocarburi alifatice și aromatice
	Hidrocarburi alifatice halogenate
	Hidrogen arseniat
	Mercur și compuși
	Monoxid de carbon
	Nitroderivați alifatici
	Nitro- și cloronitroderivați aromatici
	Pentaboran
	Plumb și compuși
	Solvenți organici (amestecuri)
	Staniu și compuși

	Tetrahidrofuran și altele
Paralizii	Compresii mecanice

5. Boli ale analizatorului vizual

Boala profesională	Noxa profesională
Conjunctivite	Alergeni și iritanți profesionali
	Radiații infraroșii
	Radiații ionizante
	Virusuri, bacterii
	și altele
Cheratite	Acid clorhidric
	Acid fluorhidric
	Amoniac
	Arsen și compuși
	Benzochinone
	Cianamidă calcică
	Clor
	Creozot
	Crezoli
	Dioxid de sulf
	Etilen-oxid (oxid de etilenă)
	Fenoli (fenol, pirocatechina, pirogalol, rezorcina și altele)
	Formiat de metil
	Hidrochinonă
	Hidrogen sulfurat
	Piridine
	Quinoleina
	Alergeni și iritanți profesionali
	Radiații infraroșii
	Radiații ionizante
	Radiații ultraviolete
	Seleniu
	Silicat de metil
	Streptococcus suis
	Sulfura de carbon
	Virusuri
	și altele
Cataracta	Dinitrocrezol
	Dinitrofenol
	Etilen-oxid (oxid de etilenă)
	Lasere
	Microunde
	Naftalină
	Radiații infraroșii
	Radiații ionizante și altele
	Trinitrotoluen
	și altele
Nistagmus	Iluminat inadecvat în mine

Astenopie acomodativa	Suprasolicitări vizuale, în special în condiții de iluminat nefiziologice cantitativ și calitativ
Nevrita optică	Alcool alilic
	Alcool metilic (metanol)
	Arsen și compuși
	Hidrocarburi alifatice halogenate
	Mercur
	Naftalină
	Nitro - și aminoderivați aromatici
	Piridine
	Sulfura de carbon
Ambliopie Diplopie Amauroza	Taliu
	Bromura de metil (monobrommetan)
	Carbamați heterociclici anticolinesterazici
	Clorura de metil (monoclorometan)
	Compuși organofosforici
	Fosfați, pirofosfați, tiofosfați, fosforamide
	Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura de fosfor)
	Monoxid de carbon
	Sulfura de carbon
Uveita Endoftalmie	Taliu
	Streptococ și altele

6. Boli ale analizatorului auditiv

Boala profesională	Noxa profesională
Hipoacuzie Surditate	Zgomot peste valorile de expunere de la care se declanșează acțiunea angajatorului privind securitatea și protecția sănătății lucrătorilor
	Substanțe chimice ototoxice (arsen, bromura de metil, n-butil alcool, compuși organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfura de carbon, toluen, tricloretilena și altele)
	Explozii cu afectarea timpanului
	Perforații ale timpanului cu scântei sau metale topite
	Trauma barometrică
	Traumatisme cu interesarea urechii medii și a timpanului
	Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
	Curent electric

7. Boli ale aparatului cardiovascular

Boala profesională	Noxa profesională
Sindromul Raynaud	Vibrații cu acțiune la nivelul membrelor superioare
	Clorură de vinil
	Rășini epoxidice
Tromboflebita de efort a membrelor superioare	Efort cu mișcări ample ale membrelor superioare
Tromboflebita profundă a membrelor inferioare	Poziție șezândă prelungită la conducătorii profesioniști de vehicule și utilaje

8. Boli ale aparatului respirator

Boala	Noxa profesională
Silicoză Silicotuberculoză	Dioxid de siliciu liber cristalin
Azbestoză	Azbest
Pneumoconioza minerului la carbune	Cărbune
Aluminoză pulmonară	Aluminiu
Berilioză	Beriliu
Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice	Antimoniu = stibiu (stibioza), bariu (baritoza), caolin (caolinoza), fibre minerale artificiale, mica (micatoza), nefelina - apatita, olivina (olivinoza), oxid de ceriu, oxizi de fier (sideroza), perlit, pulberi anorganice mixte, staniu (stanoza), talc (talcoza), tantal, titan, tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu și altele
Fibroză pulmonară	Ardezie Carburi metalice (frite) Clorura de vinil Medicamente (unele citostatice și altele) Metale grele (cobalt și altele) Radiații ionizante Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze de sudură și altele Șisturi Uleiuri minerale și altele
Afecțiuni pulmonare benigne: pleurezie benignă, atelectazii rotunde, plăci pleurale	Azbest
Bisinoză	Bumbac, cânepă, in, iută, sisal, kapoc
Bronhoalveolită alergică extrinsecă (pneumonia prin hipersensibilizare)	Acarieni Actinomicete termofile Aer condiționat Alge Alginați Amiodarona Amoebe Anhidride (ftalică, hexahidroftalică, himică, tetracloroftalică, tetrahidroftalică, trimelitică și altele) Antigene animale (inclusiv din dejecții) Artropode Aur (sărurile de aur) Bacterii aeropurtate Bagasă Blănuri Brânzeturi Bumbac Cafea verde (pulbere) Carmin (pigment din gărgărițe) Ceai (pulbere) Cereale (grâu, orz, secară și altele)

	Compost
	Enzime din detergenți
	Făina
	Fân (în special mucegăit)
	Fungi (comestibili și microscopici)
	Hamei
	Hârtie (pastă)
	Hipofiză (pulbere)
	Izocianați
	Lemn (pulberi)
	Malț
	Mumii (învelișurile lor textile)
	Neghina sorgului
	Nucă de cocos
	Paprika
	Pește (făină de pește)
	Piretroide
	Plută
	Procarbazină
	Rășini epoxidice
	Reactivul Paulis
	Sisal
	Soia (coajă)
	Trestie de zahăr
	Tutun
	Uleiuri de răcire
	Variolă (cruste variolice)
	și altele
Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz și altele)	Pulberi organice
BPOC	Pulberi organice
	Azbest
	Dioxid de siliciu liber cristalin
	Alte pulberi anorganice
	Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Rinite	Alergeni respiratori profesionali
	Iritanți respiratori profesionali
Ulcer nazal și/sau perforația septului nazal	Acid clorhidric
	Acid fluorhidric
	Arsen și compuși
	Clorură de potasiu
	Clorură de sodiu
	Crom și compuși
	Lemn (pulberi)
	și altele
Laringită	Alergeni respiratori profesionali
	Iritanți respiratori profesionali
	Suprasolicitare vocală profesională cronică
Noduli ai corzilor vocale ("nodulii	Suprasolicitare vocală profesională cronică

cântăreților")	
Iritația și inflamația acută și cronică a căilor aeriene superioare	Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
RADS (Reactive airways dysfunction syndrome = sindrom reactiv de căi aeriene)	Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Astm bronșic alergic	Alergenii respiratori profesionali
Astm bronșic nonalergic (iritativ)	Iritanți respiratori profesionali
Bronșită acută și cronică	Azbest
	Dioxid de siliciu liber cristalin
	Alte pulberi anorganice
	Pulberi organice
	Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Pneumopatia cauzată de sisteme de aer condiționat și de umidifiere a aerului	Agenți vehiculați prin sistemele de aer condiționat și de umidifiere a aerului
Pneumonia chimică	Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidică), zinc și alte metale (febra de fum)
Edem pulmonar acut	Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)
Emfizem pulmonar	Efort respirator cronic (la suflători)

9. Bolile ficatului

Boala	Noxa profesională
Hepatite toxice	Substanțe chimice hepatotoxice: arsen și compuși, brombenzen, clorură de vinil, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrină, fenoli, halotan, hidrocarburi alifactice halogenate, ioxinil, nitro-și cloronitroderivați aromatici și altele
Hepatite infecțioase	Amoebă
	Brucella
	Rickettsii (Febra Q)
	Virusuri hepatitice
	și altele

10. Boli ale pielii și tesutului subcutanat

Boala	Noxa profesională
Dermatită alergică de contact: a) eczemă alergică de contact	Antigene animale și vegetale, adezivi, biocide, cauciuc, coloranți, cosmetice, detergenți, esențe aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de luptă, medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice, chinină, corticoizi, nitrofurazonă, sulfamide și altele), metale și compușii lor, rășini naturale și sintetice (monomeri), revelatori fotografici, solvenți organici, substanțe de contrast, substanțe de curățat, uleiuri de răcire și altele
b) eczemă fotoalergică de contact	Fotoalergenii
c) eritrodermie	Insectofungicide arsenicale și mercuriale
	Tricloretilenă
	Tetracloretlenă
	și altele
d) dermatită de contact la proteine	Proteine vegetale și animale

e) eritem polimorf	Alergeni ce induc eritem polimorf
f) erupție lichenoidă	Alergeni ce induc erupții lichenoidă
g) dermatită limfomatoidă	Alergeni ce induc dermatită limfomatoidă
h) dermatită purpurică de contact (purpură alergică de contact)	Adjuvanți ai cauciucului, balsamul de Peru, coloranți (de tipul Disperse și Basic, parafenilendiamină și derivați și altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-di-hidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, fibre de sticlă, lână, medicamente (aprotinină, chinidină, flavonoide, mefenazină, peroxidul de benzoil și altele), plante (mușchii de copac, păstârnac, sumac și altele), rășini melamin-formaldehidice, rășini ureo-formaldehidice, sulfură de carbon, tetrametilol-acetilendiuree și altele
i) dermatită de contact sistemică	Alergeni ce induc dermatită de contact sistemică
Dermatită ortoergică de contact:	
a) dermatită de uzură	Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vată de sticlă, zgură și altele), pulberi organice (lemn și altele), microtraumatisme repetate și altele
b) dermatită iritativă (propriu-zisă)	Detergenți, produse petroliere, reactivi chimici, săpunuri, solvenți organici, uleiuri și lubrefianți, umezeală ("eczema menajeră") și altele
c) dermatită caustică (arsură chimică)	Acizi și baze tari (caustici)
	Alumino - silicații de calciu (ciment)
	Arsen și compuși
	Fosfor și compuși
	Var nestins (oxid de calciu)
	și altele
d) dermatită fototoxică de contact	Substanțe fototoxice
Dermatită de contact mixtă (alergică și iritativă)	Alergeni și iritanți cutanați
Urticarie, angioedem (edem Quincke), șoc anafilactic	Alergeni ce induc urticarie
	Presiune cutanată, spectrul solar (radiații infraroșii, vizibile și ultraviolete), temperaturi extreme, vibrații
Radiodermită	Radiații ionizante
Acnee profesională	Compuși halogenati, gudron de huilă, produse petroliere, uleiuri minerale și altele
Porfirie cutanată tardivă (tarda)	Hexaclorbenzen și alte hidrocarburi aromatice halogenate
	Virus hepatitic C
	și altele

11. Boli ale sistemului musculo-scheletic și ale țesutului conjunctiv

Boala	Noxa profesională
Bursite	Manipulare de greutate
Epicondilită	Mișcări repetitive
Sinovite	Microtraumatisme repetate
Tendinite	Poziții extreme, forțate, vicioase, prelungite sau violente, cu suprasolicitare și traumatizarea articulațiilor: supraîncordări,
Tenosinovite	presiuni, torsiuni, tracțiuni
Leziuni de menise	Vibrații
Artroze	
Periartrite	
Deformări ale coloanei vertebrale	
Discopatii, inclusiv hernia de disc	

12. Boli ale aparatului excretor

Boala profesională	Noxa profesională
Nefropatie toxică	Acrilonitril
	Aldrin
	Benzochinone
	Butil-toluen terțiar
	Clor
	Crezoli
	Cumen
	N, N-Dimetilformamidă
	Dimetilsulfat
	Dioxan
	Eter etilic
	Eteri de glicoli
	Etil-benzen
	Etilenclorhidrină
	Etilenglicol și derivați
	Fenoli și derivații lor halogenați și nitrați
	Fosfor și compuși
	β-Propiolactona
	Hidrazine
	Hidrocarburi halogenate alifatic
	Hidrogen arseniat
	Metale grele și compuși (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu și altele)
	Nitro- și cloronitroderivați aromatici
	Paraquat (Dipiridillium)
	Piridine
	Pirogalol
	Silicat de metil și de etil
	Stiren
	Tetralină (tetrahidronaftalină)
	Triazine
	și altele
Nefropatie infecțioasă	Brucella
	Hantavirus
	Mycobacterium tuberculosis
	Streptococ beta-hemolitic din grupul A
	și altele

13. Boli profesionale cauzate de expunerea la agenți fizici neclasificate anterior

Boala	Noxa profesională
Colaps caloric, crampe calorice, șoc caloric	Microclimat cald
Hipotermie, degerături	Microclimat rece
Îmbolnăviri datorate compresiunilor sau decompresiunilor	Presiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scăzute (hipobarism)
Boala de vibrații:	Vibrații

- sindrom osteo-musculo-articular - sindrom digestiv - sindromul Raynaud - sindrom neurologic	
Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)	Radiații ionizante
Sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrine	Câmpuri electrice și magnetice Radiații electromagnetice neionizante din banda microunde și radiofrecvență

14. Boli infecțioase și parazitare

Boala	Noxa profesională
Tuberculoză	Mycobacterium tuberculosis (uman și animal)
Hepatită A, B, C, E	Virus hepatitic A, B, C, E
Leptospiroză	Leptospira
Bruceloză	Brucella
Tetanos	Clostridium tetani
Boli infecțioase și parazitare, inclusiv tropicale, pentru care riscul de infectare a fost evaluat	Agenți biologici conform Directivei 2000/54 CEE

15. Intoxicații acute, subacute și cronice profesionale și consecințele lor

Boala	Noxa profesională
Intoxicații acute, subacute și cronice profesionale și consecințele lor	Acid azotic
	Acid cianhidric
	Acid sulfuric
	Acizi organici
	Acrilonitril
	Alcool butilic (Butanol)
	Alcool izopropilic (Izopropanol)
	Alcool metilic (Metanol)
	Amine alifatic
	Amine alifatic halogenate
	Amoniac
	Antimoniu (stibiu) și compuși
	Antracen
	Arsen și compuși
	Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiți prin formula: C_nH_{2n-6})
	Benzochinone
	Beriliu și compuși
	Bitum
	Brom
	1,4-Butandiol
	Cadmium și compuși
	Carbazol și compuși
	Cetone: acetona, cloracetona, bromacetona, hexafluoracetona, metil etil cetona, metil n-butil cetona, metil izobutil cetona, diacetona alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanonă
	Cianuri și compuși

Clor
Crom și compuși
Derivați halogenați, fenolici, nitriți, nitrați sau sulfonați ai hidrazinelor
Dietilen glicol
Disulfură de carbon
Esteri organofosforici
Esterii acidului azotic
Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter și etil eter ai etilenglicolului
Etilen glicol
Fenoli halogenați
Fenoli sau omologi
Fluor și compuși
Formaldehida
Fosfor și compuși
Fosgen (Oxiclorura de carbon)
Funingine, negru de fum
Gaz, petrol lampant
Gudroane
Hidrazine
Hidrocarburi alifactice derivate din benzină (solvent nafta) sau petrol
Hidrocarburi alifactice halogenate
Hidrocarburi aromatice (inclusiv policiclice = HPA)
Hidrocarburi aromatice halogenate
Hidrogen sulfurat
Iod
Izocianați
Mangan și compuși
Mercur și compuși
Monoxid de carbon
Naftalen (naftalină) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: C_nH_{2n-12})
Naftoli halogenați
Naftoli sau omologi
Nichel și compuși
Nitro- și aminoderivați aromatici
Nitroderivați ai glicolilor și ai glicerolului
Nitroderivați alifatici
Nitrofenoli și omologi
Oxizi alchilarilici halogenați
Oxizi de azot
Oxizi de sulf
Parafină
Plumb și compuși
Produse petroliere
Produsi de distilare a cărbunelui

	Smoală
	Sulfonați alchilarilici halogenați
	Uleiuri minerale
	Vanadiu și compuși
	Vinilbenzen și divinilbenzen
	și altele

16. Lista suplimentară - Alți factori profesionali considerați posibil nocivi:

Anhidride aromatice și compuși
Argint
Ciocolată, zahăr și făină - cauzând carii dentare
Decalină
Difenil
Difenil oxid
Fibre minerale
Fibre sintetice
Magneziu
Mercaptani
Metacrilonitril
Ozon
Platină
Sidef
Terpene
Thiopene
Tioalcooli
Tioeteri
Tiofenoli

NOTĂ:

Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.